



Aggressivität und Alzheimer Demenz

- Strukturierung der Umgebung kann Aggressivität reduzieren.
- Aggressivität tritt oft in einer vorübergehenden Phase auf: **bei Medikamenteneinsatz wiederholte Auslassversuche.**
- **Risperidon** (Risperdal®) ist zugelassen für Aggressivität und trotz vermehrter vaskulärer Ereignisse bei Berücksichtigung der vaskulären Komorbidität zu empfehlen.
- **Haloperidol** (Haldol®) ist zugelassen ohne umfangreiche Studien zu Wirksamkeit und Risiko.
- **Quetiapine** (Seroquel®) aufgrund einzelner Studien bei psychotischen Alterspatienten vermutlich auch wirksam, keine Zulassung, keine publizierte größere Studie zu Risiken.
- **Cave:** cerebrovaskuläre Ereignissrate \uparrow , QT \uparrow , Restharn \uparrow , Stürze, EPS in Kombi mit Makroliden (Clarithromycin, Domperidon)
- **Tavor expidet®:** im Notfall, max 1mg, cave: Sturzgefahr, paradoxe Wirkung selten

Risperidon (Risperdal®) ist zugelassen für Aggressivität und trotz vermehrter vaskulärer Ereignisse bei Berücksichtigung der vaskulären Komorbidität zu empfehlen

Haloperidol (Haldol®) ist zugelassen ohne umfangreiche Studien zu Wirksamkeit und Risiko

Quetiapine (Seroquel®) aufgrund einzelner Studien bei psychotischen Alterspatienten vermutlich auch wirksam, keine Zulassung, keine publizierte größere Studie zu Risiken

Cave: cerebrovaskuläre Ereignissrate \uparrow , QT \uparrow , Restharn \uparrow , Stürze, EPS in Kombi mit Makroliden (Clarithromycin, Domperidon)

Tavor expidet® im Notfall, max 1mg, cave: Sturzgefahr, paradoxe Wirkung selten